

Axoviral

Aciclovirum 50 mg/g



Ekspert

W LECZENIU
NAWROTOWEJ
OPRYSZCZKI
WARG I TWARZY

-  *Kategoria dostępności:*
LEK OTC
-  *Postać:*
KREM
-  *Wielkość opakowania:*
10 G
-  *Substancja czynna*
ACICLOVIRUM 50 MG/G



ARISTO

Axoviral
Aciclovirum 50 mg/g

Ekspert
W LECZENIU NAWROTOWEJ
OPRYSZCZKI
WARG I TWARZY



*W*skazania do stosowania

Axoviral jest wskazany w miejscowym leczeniu **nawrotowej opryszczki warg i twarzy**, wywołanej przez wirusa opryszczki pospolitej (Herpes simplex).

ARISTO

Axoviral

Aciclovirum 50 mg/g

Ekspert
W LECZENIU NAWROTOWEJ
OPRYSZCZKI
WARG I TWARZY



Skład

Lek **Axoviral** zawiera substancję czynną **acyklowir** o działaniu przeciwwirusowym, wykazującą **silne działanie na wirusa opryszczki pospolitej** (Herpes simplex).

1 g kremu zawiera 50 mg acyklowiru.

The logo for ARISTO, featuring the word 'ARISTO' in white capital letters on a dark blue background, with a red circle above the 'O' and a multi-colored horizontal bar below the text.

Axoviral

Aciclovirum 50 mg/g

Ekspert
W LECZENIU NAWROTOWEJ
OPRYSZCZKI
WARG I TWARZY



*D*awkowanie

- Zalecana dawka
5 razy na dobę w odstępach około czterogodzinnych, z przerwą nocną.
- Lek działa najskuteczniej, jeśli leczenie rozpoczyna się jak najszybciej po pojawieniu się pierwszych objawów opryszczki, jak np. pieczenie, swędzenie lub zaczerwienienie. Leczenie można również rozpocząć w późniejszym okresie choroby, gdy wystąpią grudki lub pęcherzyki. Leczenie należy prowadzić co najmniej przez 4 dni. Jeśli nie nastąpiło zagojenie zmian skórnych, leczenie można przedłużyć do 10 dni.

Axoviral

Aciclovirum 50 mg/g

Ekspert
W LECZENIU NAWROTOWEJ
OPRYSZCZKI
WARG I TWARZY



Wszystkie konkurencyjne preparaty miejscowe zawierające acyklowir mają objętość 2 a nawet 5x mniejszą niż Axoviral!*

**2x
więcej**



Niska cena

Ekonomiczne opakowanie

Łatwa aplikacja

*W porównaniu do konkurencyjnych kremów wskazanych w leczeniu nawrotowej opryszczki warg i twarzy, zawierających substancję czynną Aciclovirum, zaliczanych do kategorii leków dostępnych bez recepty.



Axoviral

Aciclovirum 50 mg/g

Ekspert
W LECZENIU NAWROTOWEJ
OPRYSZCZKI
WARG I TWARZY



A pigułce

Jaki pacjent? Z nawrotową opryszczką warg lub twarzy wywołaną wirusem Herpes simplex

Jak często? 5 razy dziennie.

Jak długo? Od 4 do 10 dni.

Gdzie? Na zmianę skórą

Od kiedy? Od 3 roku życia

