

Minovivax 2%

Minoxidilum



POBUDZA WZROST WŁOSÓW

w łysieniu typu androgenowego
u kobiet i mężczyzn



Substancja czynna:

Minoxidilum 20mg/ml - lek OTC



Postać:

PŁYN DO STOSOWANIA NA SKÓRĘ GŁOWY



Wielkość opakowania:

100 ML

Minovivax 2%

Minoxidilum







WSKAZANIA DO STOSOWANIA

Lek Minovivax 2% jest wskazany w leczeniu łysienia androgenowego u mężczyzn i u kobiet.




MINOXIDIL. MECHANIZM DZIAŁANIA

-  zwiększa średnicę cebulek włosowych
-  stymuluje porost włosów w fazie anagenowej
-  wydłuża fazę anagenową
-  skraca fazę telogenową, w wyniku czego szybciej następuje faza anagenowa.

SKŁAD

- Substancją czynną leku jest minoksydyl. 1 ml roztworu zawiera 20 mg minoksydylu.
- Minovivax 2% jest lekiem w postaci roztworu na skórę, przeznaczonym do stosowania wyłącznie na skórę głowy. Do stosowania od 18 do 65 r.ż.
- Dla uzyskania zauważalnego wzrostu włosa, konieczne może być stosowanie leku Minovivax 2% przez okres co najmniej 4 miesięcy lub dłużej.
- Wyniki leczenia są w znacznym stopniu uzależnione od systematycznego stosowania oraz indywidualnych cech pacjenta. Gorsze efekty działania minoksydylu występują u pacjentów z zaawansowanymi oraz trwającymi ponad 10 lat stanami łysienia androgenowego.
- Maksymalny efekt działania leku uzyskuje się po około 12 miesiącach systematycznego stosowania.

MINOXIDIL. SKUTECZNOŚĆ LECZENIA ŁYSIENIA ANDROGENOWEGO U KOBIET



Rys. 2. Zmiana w stosunku do wartości wyjściowej liczby włosów dojrzałych na cm²

Badanie przeprowadzone przez Lucky i wsp. W badaniu wzięło udział 381 kobiet, które poddano obserwacji podczas stosowania minoksydylu 2% oraz placebo dwa razy dziennie. W badaniu analizowano stymulację wzrostu włosów poprzez ocenę liczby nowych włosów w 48 tygodniu oraz ocenę pacjentów i badaczy, zmiany we wzroście włosów/pokrycia skóry głowy włosami w 48 tygodniu.

Minovivax 2%

Minoxidilum



do włosów długich



do włosów krótkich

Każde opakowanie zawiera zestaw  wymiennych aplikatorów

Regularne stosowanie minoksydylu hamuje nadmierną utratę włosów już po kilku tygodniach leczenia, dzięki czemu może dojść do wzrostu nowych włosów, widocznego po ok. 4 miesiącach od rozpoczęcia leczenia

Największe dostępne opakowanie **100 ml!**

Minovivax 2%

Minoxidilum

ARISTO

DAWKOWANIE

Dawkę 1 ml (6 rozpyleń) leku Minovivax należy nakładać na skórę głowy dwa razy na dobę (rano i wieczorem).



INSTRUKCJA STOSOWANIA

Instrukcja użycia leku Minovivax 2% zależy od typu stosowanego dozownika.

Pompka rozpylająca – do nakładania roztworu na większe obszary skóry głowy

- Zdjąć nakładkę zabezpieczającą pompkę rozpylającą.
- Skierować pompkę rozpylającą w kierunku powierzchni skóry objętej zmianami.
- Nacisnąć pompkę 6 razy w celu podania dawki 1 ml.
- Zaaplikować roztwór na środkową część powierzchni skóry objętej zmianami i rozprowadzić opuszkami palców,
- upewniając się, że lek został nałożony równomiernie.
- Po zakończeniu nałożyć z powrotem nakładkę zabezpieczającą.

Aplikator – do nakładania roztworu na małe obszary skóry głowy lub obszary pokryte włosami

- Dla zapewnienia bardziej precyzyjnego miejscowego nałożenia, należy użyć aplikatora dołączonego do opakowania.
- Zamienić pompkę rozpylającą na dołączony do opakowania aplikator.
- Skierować aplikator w kierunku powierzchni skóry objętej zmianami.
- Nacisnąć aplikator 6 razy w celu podania dawki 1 ml.
- Rozprowadzić roztwór opuszkami palców, upewniając się, że lek został nałożony równomiernie.
- Po aplikacji roztworu zawsze należy dokładnie umyć ręce.

W PIGUŁCE

Jaki pacjent? W leczeniu łysienia androgenowego u mężczyzn i kobiet

Ile? 1 ml - 6 rozpyleń

Jak często? Codziennie rano i wieczorem (kobiety 1 do dwóch razy na dobę)

Jak długo? Min. 4 miesiące

Od kiedy? Od 18 r.ż. do 65 r.ż.