

Myconafine[®] 1%
Terbinafini hydrochloridum



Lek na zakażenia grzybicze skóry



Kategoria dostępności:
LEK OTC

Postać:
KREM

Substancja czynna:
Terbinafini hydrochloridum 10mg/g

Wielkość opakowania:
15 g



Myconafine[®] 1%
Terbinafini hydrochloridum



Wskazania do stosowania

Terbinafina zawarta w leku **Myconafine 1% działa grzybobójczo** (powoduje śmierć komórek grzybów) na dermatofity i pleśnie. Na drożdżaki w zależności od gatunku działa grzybobójczo lub grzybostatycznie (hamuje wzrost grzybów).

Krem Myconafine 1%, jest wskazany w miejscowym leczeniu:

- ✓ grzybicy stóp,
- ✓ grzybicy podszwowej stóp (grzybica mokasynowa),
- ✓ grzybicy fałdów skórnych i skóry gładkiej,
- ✓ drożdżycy skóry,
- ✓ łupieżu pstrego.

Myconafine[®] 1%
Terbinafini hydrochloridum



Skład

Substancją czynną leku jest ***Terbinafini hydrochloridum***.

1 g kremu zawiera 10 mg terbinafiny.



Myconafine[®] 1%
Terbinafini hydrochloridum



S ZEROKIE SPEKTRUM DZIAŁANIA

Terbinafina jest lekiem przeciwgrzybiczym
o najsilniejszym działaniu przeciwzapalnym.


Myconafine[®] 1%

Terbinafini hydrochloridum



Skuteczność

WYSOKA SKUTECZNOŚĆ TERAPII



Wieloośrodkowe, randomizowane, prospektywne badanie przeprowadzone przez Budimilja i wsp. (Indonezja).
117 pacjentów z potwierdzoną grzybicą skóry gładkiej. 57 pacjentów stosowało krem terbinafina 1%, 60 osób placebo, przez okres 7 dni, smarując zmiany raz dziennie.



Myconafine[®] 1%

Terbinafini hydrochloridum



Sposób użycia

Jak często?/Jak długo?	1 tydzień	2 tygodnie
1 raz na dobę	Grzybica stóp (z wyłączeniem podeszwy)	-
	Grzybica fałdów skórnych	Łupież pstry
	Drożdżycza skóry	
2 razy na dobę	-	Grzybica podeszwowa stóp

Myconafine[®] 1%

Terbinafini hydrochloridum



Sposób użycia

Myconafine 1% posiada **gęstą konsystencję**, dzięki czemu aplikacja kremu jest łatwiejsza.

JUŻ OD
12 r.ż.



Myconafine[®] 1%

Terbinafini hydrochloridum



W pigułce

Jaki pacjent? Z zakażeniami grzybiczymi skóry wywołanymi przez dermatofity i drożdżaki

Gdzie? Punktowo na skórę w miejscu chorobowo zmienionym

Od kiedy? **Od 12 roku życia**

Jak często?/Jak długo?	1 tydzień	2 tygodnie
1 raz na dobę	Grzybica stóp (z wyłączeniem podeszwy)	-
	Grzybica fałdów skórnych	Łupież pstry
	Drożdżycza skóry	
2 razy na dobę	-	Grzybica podeszwa stóp