

Axopropfen Forte



NA BÓL,
GORĄCZKĘ
I STAN ZAPALNY

Kategoria dostępności:

LEK OTC

Substancja czynna:

Ibuprofenum

Wielkość opakowania:

400 mg - 20 tab | 50 tab

40 mg - 100 ml w zawiesinie doustnej

ARISTO

Axoprofen

Forte

Ibuprofenum 400 mg

20 50 tabletek

Tabletkę można podzielić
na dwie równe dawki.

WSKAZANIE

Dorośli, młodzież i dzieci o masie ciała powyżej 40 kg
(w wieku 12 lat i powyżej).

Krótkotrwałe objawowe leczenie:

- Bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego.
- Gorączki.



Axoprofen

Forte

Ibuprofenum 400 mg

20 50 tabletek

Tabletkę można podzielić
na dwie równe dawki.

DAWKOWANIE

Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy okres konieczny do złagodzenia objawów.

Dorośli i młodzież o masie ciała ≥ 40 kg (w wieku 12 lat i powyżej):
Dawka początkowa to 200 mg lub 400 mg ibuprofenu.
Jeśli to konieczne, można przyjmując dodatkowo 200 mg lub 400 mg.

Odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami należy ustalić w zależności od obserwowanych objawów oraz z uwzględnieniem maksymalnej zalecanej dawki dobowej.
Odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami nie powinien być krótszy niż 6 godzin. Nie należy przekraczać całkowitej dawki 1 200 mg w ciągu 24 godzin.



Axoprofen

Forte

Ibuprofenum 40 mg/ml

zawiesina doustna

100 ml



Pyszny
pomarańczowy
smak



WSKAZANIE

gorączka różnego pochodzenia (także w przebiegu zakażeń wirusowych, w przebiegu odczynu poszczipennego)

bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego, takie jak:

- bóle głowy, gardła i mięśni np. w przebiegu zakażeń wirusowych
- bóle mięśni, stawów i kości, na skutek urazów narządu ruchu (nadwyrężenia, skręcenia)
- bóle na skutek urazów tkanek miękkich, bóle pooperacyjne
- bóle na skutek ząbkowania, bóle zębów, bóle po zabiegach stomatologicznych
- bóle głowy (włącznie z migreną)
- bóle uszu występujące w stanach zapalnych ucha środkowego.

ARISTO

Axoprofen

Forte

Ibuprofenum 40 mg/ml

zawiesina doustna

100 ml



Pyszny
pomarańczowy
smak



DAWKOWANIE

Zalecana dawka dobowa leku wynosi 20 do 30 mg/kg masy ciała, podawana w 3 lub 4 podzielonych dawkach. Pomiędzy kolejnymi dawkami należy zachować co najmniej 6 godzin przerwy.

- • • • Niemowlęta w wieku od 3 do 6 miesięcy (masa ciała powyżej 5 kg): 1,25 ml (50 mg ibuprofenu) – 3 razy na dobę.
- • • • Niemowlęta w wieku od 6 do 12 miesięcy (masa ciała 7 kg-9 kg): 1,25 ml (50 mg ibuprofenu) – 3-4 razy na dobę.
- • • • Dzieci w wieku od 1 do 3 lat (masa ciała 10 kg-15 kg): 2,5 ml (100 mg ibuprofenu) – 3 razy na dobę.
- • • • Dzieci w wieku od 4 do 6 lat (masa ciała 16 kg-20 kg): 3,75 ml (150 mg ibuprofenu) – 3 razy na dobę.
- • • • Dzieci w wieku od 7 do 9 lat (masa ciała 21 kg-29 kg): 5 ml (200 mg ibuprofenu) – 3 razy na dobę.
- • • • Dzieci w wieku od 10 do 12 lat (masa ciała 30 kg-40 kg): 7,5 ml (300 mg ibuprofenu) – 3 razy na dobę.
- • • • Dzieci w wieku powyżej 12 lat (masa ciała powyżej 40 kg): 7,5 ml (300 mg ibuprofenu) – 3-4 razy na dobę.

Axoprofen

Forte

Ibuprofenum 40 mg/ml

zawiesina doustna

100 ml




Pyszny
pomarańczowy
smak



SPOSÓB UŻYCIA

1. Przed użyciem należy energicznie wstrząsnąć butelką w celu wymieszania jej zawartości.
2. Odkręcić zakrętkę butelki (nacinając do dołu i przekręcić w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara – tak jak narysowano na zakrętce).
3. Strzykawkę mocno wcisnąć w otwór w szyjce butelki.
4. Aby napęlić strzykawkę, butelkę odwrócić do góry dnem, a następnie ostrożnie przesuwając tłok strzykawki do dołu, wciągając zawiesinę aż do pożądanego miejsca na podziałce strzykawki.
5. Butelkę odwrócić do pozycji początkowej i ostrożnie wyjąć strzykawkę z butelki.
6. Końcówkę strzykawki umieścić w ustach pacjenta, a następnie, wolno naciskając tłok strzykawki, ostrożnie opróżnić zawartość dozownika.
7. Jeśli zgodnie z informacją umieszczoną powyżej dawka leku powinna być większa niż 5 ml, punkty od 2 do 6 należy powtórzyć, tak aby podać odpowiednią ilość leku.
8. Po zastosowaniu leku butelkę należy zamknąć zakręcając zakrętkę, a strzykawkę umyć i wysuszyć.



ARISTO

Axoprofen Forte



.. i po bólu